

لقاح كوفيد-19 الأسئلة الشائعة

تم التحديث في 9 يوليو 2024

لا يزال فيروس كوفيد-19 يتسبب في إصابة الأشخاص بالمرض، مما يؤدي إلى دخولهم إلى المستشفى وتعرضهم للوفاة - لذا، من المهم أن يتلقى كل الأشخاص المعرضين للإصابة به اللقاح.

? هل أحتاج إلى التطعيم مرة أخرى إذا كنت قد تلقيت اللقاح بالفعل؟

نعم - يجب أن يحصل كل شخص يبلغ من العمر 6-19 عامًا للعام 2024/2025 طالما مضى شهرين منذ تلقيه آخر لقاح لفيروس كورونا كوفيد-19. إذا لم تكن متأكدًا، فاسأل طبيبك أو تحقق من [موقع مركز مكافحة الأمراض على الويب](#) لمزيد من المعلومات.

? ما الآثار الجانبية للقاحات فيروس كورونا كوفيد-19 للعام 2024/2025؟

كما هو الحال بالنسبة للقاحات كوفيد-19 الأخرى قد تشمل الأعراض الجانبية الأكثر شيوعًا:

- الإرهاق
- الصداع
- ألم في العضلات
- ألم واحمرار وتورم في موقع الحقن

? لماذا نحتاج إلى لقاح آخر لفيروس كورونا كوفيد-19؟

نعم - يمكنك ذلك، بل وينبغي عليك، الحصول على أي لقاحات أخرى يجب أن تحصل عليها في نفس الزيارة.

? لماذا نحتاج إلى لقاح محدث لكوفيد-19؟

لقد تغير فيروس كوفيد-19 منذ ظهور أولى تطعيماته. يعد تلقي أحدث لقاحات كوفيد-19 أفضل طريقة لتجنب دخول المستشفى والوفاة وغيرها من الحالات الصحية طويلة المدى كوفيد-19.

? هل أحتاج إلى التطعيم مرة أخرى إذا كنت قد تلقيت اللقاح بالفعل؟

على الأرجح - يجب على كل شخص يبلغ من العمر 6 أشهر فأكثر أن يحصل على أحدث لقاح لكوفيد-19 بمجرد أن يمر شهرين على تلقيه آخر لقاح لكوفيد-19. إذا لم تكن متأكدًا، فاسأل طبيبك أو يمكنك زيارة الموقع الإلكتروني لمركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها لمعرفة المزيد من المعلومات.



